


## Information zur Impfung gegen Meningokokken B



Meningokokken sind Bakterien, die in verschiedene Gruppen (u.a. A,B,C, W135, Y) eingeteilt werden. In Deutschland tritt überwiegend die Gruppe B (69%) auf, des Weiteren die Gruppe C, während andere Serogruppen eher selten auftreten.

Die Erreger kommen bei 10% der Bevölkerung im Nasenrachenraum vor, ohne jegliche Beschwerden zu verursachen.

- Übertragung: Tröpfcheninfektion

### Symptome:

- zu Beginn Kopfschmerzen, Fieber, Reizempfindlichkeit, Übelkeit, Erbrechen, Schwindel und starkes Krankheitsgefühl
- breiten sich die Bakterien weiter im Körper aus so kann es zu Hirnhautentzündung (Meningitis) mit Nackensteifigkeit, zu Blutungen, zur Blutvergiftung des Körpers (Sepsis) oder zu Infektionen weiterer Organe mit Organversagen kommen.

2/3 der Erkrankungen verlaufen mit einer Hirnhautentzündung, 10 % sterben, 10% der Überlebenden leiden unter Komplikationen wie Hörverlust, neurologischen Schäden oder tragen Amputationen davon.

### Behandlung:

Eine Behandlung mit Antibiotika ist möglich. Allerdings kommt aufgrund des schnellen Verlaufs der Erkrankung eine Therapie häufig zu spät oder die Erreger reagieren nicht auf das Medikament.

**Besonders gefährdet:** Kinder in den ersten Lebensjahren und Jugendliche im Alter von 15-19 Jahren

### Effektivster Schutz:

#### Impfung:

Von der Stiko bisher nur für gefährdete Personen mit Immundefizienz empfohlen, daher keine sichere Übernahme der Kosten von den Krankenkassen - viele Kassen erstatten jedoch die Kosten.

Reisemedizinische Relevanz (empfohlen z.B. bei Reisen nach Österreich, Italien, Frankreich, wenn Kontakt zur Bevölkerung wahrscheinlich, Camping..)

#### Impfschema:

Säuglinge 3-11 Monate: 2 Impfungen im Abstand von 2 Mon., Auffrischung im Alter von 12-23 Mon.

Kinder 12-23 Monate: 2 Impfungen im Abstand von 2 Mon., Auffrischung nach 12-23 Monaten

Kinder 2-10 Jahre: 2 Impfungen im Abstand von 2 Monaten, keine Auffrischung vorgesehen

Jugendliche ab 11 Jahren und Erwachsene: 2 Impfungen im Abstand von 1 Mon. Keine Auffrischung

#### mögliche Nebenwirkungen:

sehr häufig: Essstörungen, Schläfrigkeit, ungewöhnliches Schreien/Weinen, Erbrechen, Diarrhoe, Hautausschlag, Fieber (>38 Grad), Druckschmerz, Rötung oder Verhärtung an der Injektionsstelle

gelegentlich: Krampfanfälle, Fieber >40 Grad, Blässe, Ekzeme

**Kosten Impfstoff (Bexsero):** ca. 110,00 Euro, Impfung und Untersuchung: ca. 25,00 Euro

Ich wünsche eine Impfung mit Bexsero (Men-B-Impfung) für:

.....

Immenstadt, den .....

Unterschrift Sorgeberechtigter:.....